




Übungen zur Elektrodynamik

Theoretische Physik II

WS 2018/19



Prof. Dr. H. Fehske
<http://theorie2.physik.uni-greifswald.de>

Blatt 4

Abgabe: **Montag, 12.11.18** vor der Vorlesung

Aufgabe 11

Die Bewegungsgleichung einer Punktladung (Ruhemasse m , Ladung q) im elektromagnetischen Feld ist, wie in der Vorlesung behandelt, durch

$$m \frac{d}{d\tau} u^\alpha = \frac{q}{c} F^{\alpha\beta} u_\beta \quad (1)$$

gegeben, mit dem Feldstärketensor

$$F^{\alpha\beta} = \begin{pmatrix} 0 & -E_x & -E_y & -E_z \\ E_x & 0 & -B_z & B_y \\ E_y & B_z & 0 & -B_x \\ E_z & -B_y & B_x & 0 \end{pmatrix}$$

wobei $\mathbf{E} = (E_x, E_y, E_z)$ und $\mathbf{B} = (B_x, B_y, B_z)$ elektrisches und magnetisches Feld sind. Unter einer Lorentz-Transformation gilt für den Feldstärketensor

$$(F')^{\alpha\beta} = \Lambda^\alpha_\gamma \Lambda^\beta_\delta F^{\gamma\delta}. \quad (2)$$

- Bestimmen Sie die Transformation von \mathbf{E} und \mathbf{B} für den Fall einer speziellen Lorentz-Transformation entlang der x -Achse.
- Ist Λ^α_β eine rein räumliche Transformation, sprich $\Lambda^0_i = \Lambda^i_0 = 0$, so transformieren \mathbf{E} - und \mathbf{B} -Feld unabhängig voneinander, und zwar wie?
- Bei einer Spiegelung $x \mapsto -x$ an der yz -Ebene wechselt die x -Komponente von u^α ihr Vorzeichen, genauso wie beim Ortsvektor. Wie müssen sich die Komponenten von $F^{\alpha\beta}$ transformieren, damit weiterhin Gl. (1) gilt? Dieses Verhalten läßt sich freilich auch aus Gl. (2) ablesen, wenn man Λ^α_β für unsere Spiegelung hinschreibt. Folgern Sie, daß das \mathbf{E} -Feld ein polarer Vektor ist (behält bei Spiegelung das Vorzeichen bei), und das \mathbf{B} -Feld ein axialer Vektor (wechselt das Vorzeichen unter Spiegelung).

Aufgabe 12

Im Ruhesystem eines leitenden Mediums genügt die Stromdichte dem Ohmschen Gesetz $\mathbf{j}' = \sigma \mathbf{E}'$, wobei σ die Leitfähigkeit ist und die Striche ' die Größen im Ruhesystem bezeichnen. Die Geschwindigkeit des Mediums gegenüber einem bestimmten Inertialsystem sei $\mathbf{v} = c\boldsymbol{\beta}$.

- Man zeige, dass der räumliche Stromvektor in diesem System durch

$$\mathbf{j} = \gamma\sigma[\mathbf{E} + \boldsymbol{\beta} \times \mathbf{B} - \boldsymbol{\beta}(\boldsymbol{\beta} \cdot \mathbf{E})] + \rho\mathbf{v}$$

gegeben ist, wobei ρ die Ladungsdichte in diesem System ist.

- Wie lauten die Ladungsdichte und der Ausdruck für \mathbf{j} , wenn das Medium im Ruhesystem ungeladen ist ($\rho' = 0$)?

Aufgabe 13

In einem Bezugssystem Σ ist ein skalares Feld durch

$$\phi(x^\alpha) = e^{-(x^1)^2} = e^{-x^2}, \quad (x^\alpha = (x^0, x^1) = (ct, x))$$

gegeben (wir betrachten nur eine Raumrichtung). Die Abbildung $x^\alpha \mapsto \phi(x^\alpha)$ ordnet also jedem Raumzeitpunkt x^α einen Lorentz-Skalar $\phi(x^\alpha)$ zu.

- (a) Berechnen Sie die Ableitung $\partial_\alpha \phi = (\partial\phi/\partial x^0, \partial\phi/\partial x^1)$.
- (b) Bestimmen Sie das Feld $\phi(\tilde{x}^\alpha)$ in einem Bezugssystem $\tilde{\Sigma}$, welches sich mit Geschwindigkeit v relativ zu Σ bewegt.
- (c) Berechnen Sie die Ableitung $\tilde{\partial}_\alpha \phi = (\partial\phi/\partial \tilde{x}^0, \partial\phi/\partial \tilde{x}^1)$ in $\tilde{\Sigma}$. Überprüfen Sie daran, daß sich $\partial_\alpha \phi$ wie ein kovarianter Vektor transformiert.